

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

D L P - 5 - 5 - 6 9 9 2 3 1 3 4

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, 16, rue de la République - MONTPELLIER

C.C.P. : MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 francs

N° 103 - AVRIL 1969/I4

4° supplément

## ARBRES FRUITIERS A NOYAU

Les conditions atmosphériques actuelles favorisent le développement des maladies cryptogamiques (Monilia, Oïdium, Cloque ...). L'exécution d'un traitement est nécessaire sur toutes les espèces. Pour beaucoup de vergers il faut prévoir la réalisation de bouillies mixtes si la présence d'insectes est constatée.

Sur abricotier : traiter contre le Monilia, l'Oïdium, l'Anarsia et les chenilles arpenteuses.

Sur cerisier : traiter éventuellement contre le Monilia, le Gnomonia, les chenilles arpenteuses, les pucerons.

Sur pêcher : traiter contre l'Oïdium, la Cloque, la Tordeuse orientale (le vol a commencé), les pucerons.

Sur prunier : prévenir la Moniliose qui compromettrait une récolte qui semble devoir être satisfaisante.

L.L.TROUILLON

## POMMIER

### TAVELURE - PUCERONS - OIDIUM

La Tavelure du pommier est apparue avec plus ou moins d'intensité dans les vergers de la vallée de l'Orb et du Jaur ainsi que sur les communes de Castelnau le Lez, Mauguio et sans doute ailleurs. Cette maladie se manifeste dans les plantations atteintes en 1968 (attaque de septembre) et mal protégées. Les prochaines contaminations se manifesteront sur les jeunes fruits. Il est donc nécessaire, dans de tels vergers, d'effectuer des pulvérisations fongicides très soigneusement et à une cadence assez rapprochée pendant la croissance du végétal.

Dans le Bas Languedoc ce sont les variétés "rouges" qui sont les plus atteintes.

Il convient de ne pas confondre les dégâts occasionnés par la Tavelure avec ceux provoqués par des brûlures notamment les embruns.

La Tavelure se manifeste à la face supérieure des feuilles par des taches arrondies, fumeuses, assez mal délimitées. Par transparence on remarque un halo plus ou moins décoloré autour de cette tache. La brûlure par contre est nettement marron ou grise et bien délimitée, sans halo.

Nous rappelons notre dernier bulletin concernant les Pucerons et l'Oïdium

M. BEZUT

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

Tirage du 28/4/1969

Ministère de l'Agriculture  
STATION REGIONALE D'AVERTISSEMENTS  
VITICOLES

Ecole Nationale Supérieure Agronomique de  
MONTPELLIER

--:--:--:--:--

Montpellier le 28 Avril 1969

NOTE : 2

MILDIU

A la suite des pluies des jours précédents, la germination des oeufs d'hiver du mildiou a été constatée le 28 avril dans le vignoble de l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier.

Des taches vont donc apparaître, notamment sur les repousses nées au pied des souches dont la végétation est déjà avancée.

Il y a donc lieu :

1°) de rechercher les sarments oubliés à la taille, ainsi que les gourmands situés près de terre, et de les supprimer au sécateur.

L'opération sera, cette année, très utile;

2°) on effectuera un premier traitement dans les parcelles où, par suite de la longueur des rameaux, les grappes sont nettement détachées.

EUDEMIS

Le premier vol de papillons d'eudémis, a débuté à Bais, Peyrestortes, St-Jean-Lasseille; il est faible. Quelques pontes ont été observées.

Le traitement qui s'y rapporte est à effectuer cette semaine.

Le Directeur de la Station Régionale  
d'Avvertissements Viticoles :

G. BERNON